

医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	鼻炎用点鼻薬
製品名	ナザールGスプレー NAZAL G SPRAY
製品の特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●霧状の小さな粒子が鼻腔内にいきわたり、鼻づまり、鼻水に効果をあらわします。 ●ナファゾリン塩酸塩の働きにより鼻腔内の血管を収縮させ、うつ血や炎症を抑え、鼻の通りをよくします。 ●クロルフェニラミンマレイン酸塩の働きにより、鼻腔内のアレルギー症状を抑え、効果をあらわします。 ●一定量の薬液が噴霧できるスプレーです。一度スプレーした液は、容器内に逆流しませんので衛生的です。
効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重
用法・用量	<p><年齢：1回使用量：1日使用回数></p> <p>成人（15歳以上）：1～2度ずつ：6回を限度として鼻腔内に噴霧してください なお、適用間隔は3時間以上おいてください</p> <p>7～14歳：1～2度ずつ：6回を限度として鼻腔内に噴霧してください なお、適用間隔は3時間以上おいてください</p> <p>7歳未満：使用しないでください</p>
用法・用量関連注意	<ol style="list-style-type: none"> (1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起こすことがあります。 (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (4)点鼻用にのみ使用してください。
成分分量	<p>100ml 中</p> <p>ナファゾリン塩酸塩：50mg：鼻腔内の血管を収縮させ、うつ血や炎症を抑え、鼻づまりを改善します。</p> <p>クロルフェニラミンマレイン酸塩：500mg：アレルギーによる鼻づまり、鼻水を楽にします。</p> <p>ベンザルコニウム塩化物：10mg：殺菌作用により、細菌による鼻粘膜の炎症を抑えます。</p> <p>グリチルリチン酸二カリウム：300mg：アレルギーによる鼻粘膜の炎症を抑えます。</p>
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 長期連用しないでください</p> <p>■相談すること <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください <ol style="list-style-type: none"> (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください <関係部位：症状> 皮膚：発疹・発赤、かゆみ 鼻：はれ、刺激感 3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください </p>
添加物	マクロゴール、リン酸二水素K、リン酸水素2K、塩化Na、パラベン、クエン酸、香料、(フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコール、ポリソルベート20を含む)
保管及び取扱い上の注意	<ol style="list-style-type: none"> (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にカバーをして保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。) (4)他の人と共用しないでください。 (5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
その他	<p><使用方法></p> <ol style="list-style-type: none"> 1、頭部のカバーをはずします。 2、容器の先端を上向きに持ち、薬液が霧状になって出てくるまで、数回押してください。 3、鼻をかんで鼻腔の通りをよくし、容器をまっすぐに鼻腔内に入れ、静かに息を吸いながらスプレーしてください。 4、ご使用後はノズルをティッシュペーパーなどでふいて、カバーをしてください。 <p><使用にあたっての注意></p> <ol style="list-style-type: none"> 1、ご使用前には鼻をかみ、鼻腔の通りをよくしておいてください。 2、最初にご使用になるときは、液が出るまで数回押してください。 3、容器を横にして使用しますと、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにしてお使いください。 4、ノズルの先端を針等で突くと折れた時危険ですのでおやめください。

	5、ご使用後はノズルをティッシュペーパーなどで拭いて、清潔に保ってください。
製造販売会社	佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号
リスク区分	第2類医薬品
多言語製品情報に関する免責事項	<ul style="list-style-type: none">本製品は、日本国内での販売と使用を目的に、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいて承認された医薬品です。多言語製品情報は、その製品の日本添付文書を翻訳したもので、あくまでも参考情報として提供されるものです。その記載内容およびその製品自体が日本国外の法規に適合することを保証しません。多言語製品情報は提供者（または当社）による翻訳であり、今後予告なしに変更、および変更される可能性があります。多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題についてプロバイダ（または当社）は、一切の責任を負いません。